



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(Минздрав Удмуртии)

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  
ТАЗАЛЫКЕЗ УТЁНЬЯ  
МИНИСТЕРСТВО

почтовый адрес: пер. Интернациональный, 15  
г. Ижевск, 426008

тел.: (3412) 60-23-00, факс: (3412) 60-23-23,  
e-mail: info@minzdrav.udmlink.ru  
ОКПО 00086740, ОГРН 1021801177100,  
ИНН/КПП 1831044979/184101001

24.08.2017 № 09108/09-13

Главным врачам бюджетных  
учреждений здравоохранения  
Удмуртской Республики

## О направлении памятки по ЭВИ

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики направляет для размещения на сайтах подведомственных учреждений здравоохранения Памятки для населения по энтеровирусной инфекции.

Приложение на 2-х стр.

Заместитель министра

Л.А. Гузнищева

О.В. Макарова  
60-23-37

## **ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ**

Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.

Энтеровирусные инфекции характеризуются быстрым распространением заболевания.

Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный.

Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.

Источником инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой.

Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротовоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения, для окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработки употребляемых фруктов, овощей и последующим ополаскиванием кипятком.

Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.). Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.

Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания. При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением!